

## ĐỐI TƯỢNG PHÒNG TRỪ

Stmed-Permethrin 50EC là chế phẩm diệt côn trùng chứa Permethrin có hiệu lực diệt cao đối với muỗi.

## HƯỚNG DẪN AN TOÀN

- Tránh tiếp xúc trực tiếp với hóa chất.
- Mặc đồ bảo hộ lao động thích hợp, mang găng tay, mặt nạ khi pha và phun hóa chất.
- Tránh hít phải hơi hóa chất.
- Không ăn, uống, hút thuốc trong khi pha và phun hóa chất.
- Rửa sạch tay và mặt sau khi sử dụng hóa chất.
- Không phun trực tiếp vào thực phẩm, nước uống, các bộ phận chuyển động của thiết bị điện tử.
- Không dùng lại vỏ chai, tiêu hủy vỏ chai đã dùng hết theo đúng quy định của chính quyền sở tại.

## TÁC DỤNG PHỤ VÀ CÁCH XỬ LÝ

- Nếu hít, uống hoặc để hóa chất tiếp xúc nhiều với da có thể gây các triệu chứng buồn nôn và nôn, khó thở, thở nhanh, run nhẹ hoặc mạnh, tăng nhạy cảm với kích thích bên ngoài, kiệt sức và cảm giác ngứa ngoài da.
- Nếu hít phải hóa chất: đưa nạn nhân ra nơi thoáng khí, thay quần áo bị dính hóa chất, rửa sạch vùng da bị dính hóa chất bằng nước và xà phòng.
- Nếu hóa chất tiếp xúc với da: cởi bỏ quần áo dính hóa chất, rửa sạch vùng da nhiễm hóa chất bằng nước và xà phòng.
- Nếu để hóa chất dính vào mắt: rửa mắt bằng nước sạch trong 10 - 15 phút.
- Uống phải hóa chất: cho nạn nhân uống 1 - 2 cốc nước, không cố gây nôn, đưa nạn nhân đến bệnh viện và mang theo nhãn này.



NGUY HIỂM - BẢO QUẢN XA TRẺ EM



# STMED PERMETHRIN 50EC

Hoạt chất: Permethrin 50% w/v

Diệt trừ hữu hiệu  
các loài muỗi sốt rét,  
sốt xuất huyết

**Hạn sử dụng: 3 năm**



Nhà sản xuất:

 **Agropharm Ltd**  
A PELGAR COMPANY

Buckingham Place, Church Road, Penn  
Buckinghamshire HP10 8LN  
United Kingdom  
www.agropharm.co.uk  
www.pelgar.co.uk

Số lô:

Ngày sản xuất:

Hạn sử dụng:

Nhà phân phối:

**CTY CP Y TẾ & ĐẦU TƯ  
THƯƠNG MẠI SAO NAM**

20/23 Ngõ 165, Thái Hà,  
Đống Đa, Hà Nội  
ĐT: + 84 (4) 22133555  
Fax: + 84 (4) 35149865  
www.stmed.com.vn

Số đăng ký:

VNDP-HC-513-01-11



Dung tích

**1 lít**

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Stmed-Permethrin 50EC sử dụng để phun tồn lưu, phun ULV và tắm màn.
- Stmed-Permethrin 50EC pha loãng với nước hoặc dầu. Chuẩn bị sẵn dung dịch pha nếu cần, không nên lưu trữ hóa chất đã pha loãng, tỷ lệ pha được áp dụng như sau:

### PHUN DIỆT MUỖI

Sử dụng	Kỹ thuật phun	Tỷ lệ pha với nước/ dầu	Mức áp dụng
Trong nhà	Phun tồn lưu	25ml/ 10L	300m <sup>2</sup> vách tường
	ULV	100ml/L	10-20ml/nhà
Ngoài nhà	Phun mù nóng	100ml/10L	2L/ha
	Phun tồn lưu	25ml/ 10L	300m <sup>2</sup> vách tường
	ULV	100ml/L	0,5L dung dịch/ha
	Phun mù nóng	100ml/10L	2L/ha

### TẮM MÀN

Sử dụng	Tỷ lệ pha với nước/ dầu	Mức áp dụng
---------	-------------------------	-------------

#### Mùng tuyền

- Mùng đơn (9 m <sup>2</sup> )	3,6ml/377ml	01 mùng
- Mùng đôi (16,5m <sup>2</sup> )	6,6ml/695ml	

#### Mùng vải

- Mùng đơn (9 m <sup>2</sup> )	3,6ml/574ml	01 mùng
- Mùng đôi (16,5m <sup>2</sup> )	6,6ml/995ml	

**Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng**